

# Calendula-Salbe-Heel S

Pomada

Medicamento homeopático

**Vía de administración:** Uso cutáneo.

**Composición:** 100 g cont.: Calendula officinalis Ø 10 g. Excipientes: alcohol cetílico esteárico emulgente, parafina líquida, petrolato blanco, agua purificada y etanol. Contiene 14,5 % (vol.) de etanol. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Forma farmacéutica y contenido del envase:** Tubo conteniendo 50 g de pomada.

**Titular:**

Laboratorios Heel España, S.A.U.  
C/Madroño, s/n.  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

**Fabricante:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden-Baden  
Alemania


**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del excipiente.

**Precauciones:** No se han descrito.


**Interacciones:** No se han descrito.

**Advertencias:** No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de usar este medicamento. No afecta a la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización del medicamento.

**-Heel**



Advertencia sobre excipientes: las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel. El alcohol cetosteárilico puede producir irritación cutánea local (p. ej. dermatitis de contacto).



Deberá acudir al médico en caso de presentar fuerte inflamación cutánea, fiebre o síntomas prolongados, difusos o de nueva aparición, ya que puede tratarse de una enfermedad que requiera un diagnóstico médico. Las quemaduras extensas (en niños, quemadura o escaldamiento, por ejemplo, del brazo) siempre requieren tratamiento médico. También deberá consultar al médico en caso de que los síntomas se agraven, así como en caso de presentar síntomas prolongados, difusos o de nueva aparición.


**Posología:** En general, aplicar 1-2 veces al día sobre la zona afectada.

**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es muy poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

**Reacciones adversas:** En casos muy poco frecuentes pueden aparecer reacciones alérgicas cutáneas (enrojecimiento, hinchazón y picor). En este caso se deberá interrumpir la administración del medicamento. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. Proteger del calor.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**Este medicamento debe mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**

