

# Traumeel s

Pomada

Medicamento homeopático

Vía de administración: Uso cutáneo.

**Composición:** 100 g cont.: Arnica montana D3 1,5 g; Calendula officinalis Ø 0,45 g; Hamamelis virginiana Ø 0,45 g; Echinacea angustifolia Ø 0,15 g; Echinacea purpurea Ø 0,15 g; Chamomilla recutita Ø 0,15 g; Bellis perennis Ø 0,1 g; Symphytum officinale D4 0,1 g; Hypericum perforatum D6 0,09 g; Achillea millefolium Ø 0,09 g; Aconitum napellus D1 0,05 g; Atropa belladonna D1 0,05 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g; Hepar sulfuris D6 0,025 g. Excipientes: agua purificada, etanol, parafina líquida, parafina sólida, alcohol cetosteárico emulsificante. Contiene 13,8 % (vol.) de etanol. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Forma farmacéutica y contenido del envase:** Tubo conteniendo 50 g ó 100 g de pomada.

**Titular:**

Laboratorios Heel España, S.A.U.  
C/Madroño, s/n.  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

**Fabricante:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden-Baden  
Alemania

**Indicaciones terapéuticas:** Medicamento tradicionalmente utilizado en las lesiones traumáticas de todo tipo, tales como esguinces, luxaciones, contusiones, hemartrosis y los derrames en una articulación, la regulación de los procesos inflamatorios en diferentes órganos y tejidos, incluyendo en particular los trastornos agudos y crónicos / degenerativos del sistema musculoesquelético.

**Contraindicaciones:** Alergia conocida (hipersensibilidad) a alguna de las sustancias activas o excipientes, incluyendo las plantas de la familia de las compuestas, como Arnica montana, Calendula officinalis, Chamomilla recutita, Echinacea, Achillea millefolium o Bellis perennis y alcohol cetosteárico emulsificante.

**Precauciones:** No se han descrito.

**Interacciones:** No se han descrito.

**-Heel**

**Advertencias:** Evite el contacto con los ojos, mucosas, heridas abiertas o piel dañada.

No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No afecta a la capacidad de conducción de vehículos o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización del medicamento.

**Advertencia sobre excipientes:** Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetosteárico.


**Posología:** Uso cutáneo. Dosis estándar: Adultos y niños a partir de 12 años: Aplicar 2 veces al día, o con mayor frecuencia si fuera necesario. Niños menores de 2 años: Aplicar 2 veces al día, o con mayor frecuencia si fuera necesario. Niños entre 2-5 años: Aplicar 2 veces al día, o con mayor frecuencia si fuera necesario. Niños entre 6-11 años: Aplicar 2 veces al día, o con mayor frecuencia si fuera necesario. Aplicar generosamente sobre la zona afectada. Puede aplicarse con un vendaje de compresión leve y / o vendaje oclusivo.

**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

**Reacciones adversas:** Pueden presentarse reacciones alérgicas cutáneas (hipersensibilidad) en casos muy raros (menos de 1 de cada 10.000 personas). Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. Proteger del calor.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Una vez abierto el tubo caduca a los 12 meses.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**