

## Gotas orales en solución

Medicamento homeopático

**Composición:** 100 g contienen: Colocynthis D2, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200 ana 0,8 g; Gnaphalium polycephalum D1, Gnaphalium polycephalum D10, Gnaphalium polycephalum D30, Gnaphalium polycephalum D200 ana 0,2 g. Excipiente: etanol 35% V/V. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase cuentagotas conteniendo 30 ml o 100 ml de gotas orales en solución.

## Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U. C/Madroño, s/n. 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

## Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: No se han descrito.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Advertencias sobre excipientes: este medicamento contiene 35% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 140 mg/ 10 gotas, lo que equivale a 2,8 ml de cerveza o 1,2 ml de vino. Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

Posología: Vía oral. En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar baio control médico.







**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

**Reacciones adversas:** No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE 🔁 de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

